

79
Suite de la cure générale des
fractures. et de l'observation de
gagliardi

6^e. Page



(a) obs. 55

D'elle. étoit un tissu Spongieux très
Confus qui ne paroissoit fait que
de fragmens osseux. C'estoit dit l'auteur
la suite d'une fracture mal traitée
il ne faut pas s'attendre à trouver
dans les observateurs anciens la
même exactitude dans leurs obser-
-ations que nous y en mettons
aujourd'hui, cela n'empêche pas que
dans celles que nous relatons d'après
rolfincius, hildanus, gagliardi, on
ne reconnoisse dans la defectuosité
du Cal du fémur dont ils parlent
un chevauchement, il est vrai que
l'on ne peut rien tirer de ces faits
touchant la nature de ces
chevauchemens mais toujours est
il vrai que voila des chevauchemens
avec Calus dans 4 fractures du
fémur les exemples suivans ne
laissent pas la moindre
incertitude sur l'espèce des chevauch-
-emens.
De heide (a) représente le
fémur

femur d'un homme mort about
 de quelque mois des suites d'une —
 fracture compliquée, les deux bouts
 de l'os ne sont point affrontés direc-
 tement, mais ils chevauchent l'un
 sur l'autre, l'espace qui les ~~separe~~ separe
 et même les environs de la fracture
 jusqu'à une grande distance, sont
 remplis par un calus dont la
 dureté et la blancheur ne le
 cedent point à l'os même. outre
 une infinité de petits pores on
 y apperoit dit l'auteur, trois
 trous considérables, et la surface
 en est semée de tubercules. quoi
 que d'abord (Continue de ~~haut~~ heide)
 le cal parait faire partie de l'os,
 en sorte qu'on l'auroit pris pour
 le femur qui s'étoit gonflé on
 est cependant venu about de
 le détacher sans endommager l'os,
 le canal médullaire est ouvert
 dans les deux pièces fracturées,
 il est à remarquer pour l'intelligence
 d'une

D'une partie de cette observation
 que cet examen ^{est fait} seulement quelques
 mois après la fracture et avant
 que le cal de cloture fut complètement
 formé, et celui de réunion complètement
 endurci.

Du chevauchement dont il s'agit ici

et un peu interne

+ et ce qui fait un exemple de -
 chevauchement en devant.

(a) chez le premier p. 469 seq.

(b) dans son memoir sur le formalin
 du Cal.

(c) Disp. 1706. p. 65 seq.



j'ajouterais que dans la figure
 le fémur est représenté en arrière,
 et que dans cette position l'extrémité
 inférieure de la pice de haut est
 devant supérieure de la pice de
 bas pose contre la face antérieure
 de l'extrémité inférieure de la
 pice de haut, ce qui est le
 contraire de ce que nous avons
 remarqué dans nos observations.
 + ajoutons à ces faits l'exemple
 de chevauchement rapporté par
 verdue (A) si l'aut est ~~il est~~
 qu'il ne soit pas le même que
 celui de heide, le fait cité par
 Mr Bordenave (B). Celui qui est
 rapporté par J. Ch. Keyne de ossium
 morbis (c) ou les deux bouts du fémur
 cassé passaient un peu l'un à côté
 de l'autre

de l'autre, le mot à Côté n'a peut-être
pas été bien pesé quand on s'en
est servi, car il n'y a que peu de
chevauchement du fémur sur les
Côtés, et peut-être n'aurait-on voulu
dire autre chose, si non que les
bords d'os n'étaient point affrontés.
mais qu'ils glissaient ~~les~~ parallèlement
l'un sur l'autre. Le Calus étoit
solide, on y voyoit des pores, trois
grands trous. l'auteur est parvenu
à le détacher sans rien prendre
sur les extrémités des os, leur
cavité médullaire étoit ouverte.

rapprochons encore ici les ^{13.} ~~faits~~
faits suivants que Mr Daubenton
a décrits et dont les pièces sont
au ^{Cabinet} ~~par~~ du roy.

Celui d'un fémur droit cassé à
sa partie moyenne, où l'extrémité
inférieure est remontée par derrière
la Supérieure (a)

Cet autre encore du fémur droit,
cassé à sa partie moyenne, où
l'apice inférieure a remonté
par

(a) hist. nat. tom 3 in 4. no. 262
p. 126

(a) hist nat. tom 3. in 4. n° 261
p. 125.

(b) tom 3. no. 244 p. 124.

30 lignes de chevauchement

il paroit qu'il faut compter
ce 4^e fait pour 2 chevauchement.
Car si l'une des lattes fracturées
n'eut point chevauché, l'autre
l'étant eût été une. Cio Comtance
assez considérable pour que
l'auteur n'ait pas manqué
de l'observer.

30 lignes de chevauchement



par derrière et un peu sur le
côté intérieur de la pièce de dessus

(a).

Le 3^e ou le ^{droit} femur a été cassé à
sa partie supérieure un peu au
dessous du Col. la pièce d'enbas
a remonté derrière celle d'en haut
d'environ deux pouces et demi, et
s'est mise dans une position
oblique qui devoit faire toucher
le genouil droit contre le genouil
gauche. (b)

Ces 4^e ^{et 5^e} ~~étaient~~ d'un homme qui
eut les deux cuisses cassées par la
roue d'une voiture qui passa par
dessus. la fracture fut faite à
la partie moyenne inférieure.
la pièce d'enbas remonta derrière
la pièce d'en haut et s'éleva
d'environ deux pouces et demi. le
Calus s'est formé dit M. Daubanton
sans qu'elles aient été remises en
place. les deux pièces sont
parallèles

parallèles l'une à l'autre et
 écartées d'un pouce, cet espace
 est rempli par le Cal à l'endroit
 de la fracture de sorte que
 l'extrémité inférieure de la pièce
 Supérieure débordé presque d'un
 pouce et demi au dessous du Calus
 il y a au dessus du côté intérieur
 du Calus de los de la cuisse droite
 une pointe osseuse de la longueur
 d'un demi pouce. (a)

6^e fait fracture à la cuisse
 gauche, elle avoit été cassée à la
 partie moyenne, la pièce inférieure
 a un peu remonté derrière la
 Supérieure. (b)

7^e fait los étoil après dans
 le même état que celui qui a
 été rapporté sous le nom précédent
 qui est le 269 ce qu'il y a de
 différent c'est que l'on a scie dans
 la suite le Calus selon la direction
 de la fracture, on ne reconnoît pas
 cette coupe aucune différence entre
 la substance

(a) mem ouvrage no 266 pp 124.

(b) mem ouvrage no 269 pp 128

- (a) mem ouvrage n° 270.
 (b) mem ouvrage n° 271 p. 128
 (c) mem ouvrage n° 272 p. 129
 Le mot cassé dans le même sens
 doit être pris le même sens pour
 déplacé dans le même sens.

Substance du Calus et celle de l'os —

(a)

8^e fait. fracture à la partie
 moyenne de la cuisse gauche. La
 pièce inférieure à un peu remonté
 derrière la supérieure et se trouve
 sur une ligne qui lui est parallèle
 à environ un pouce de distance,
 le Cal occupe en partie cet
 intervalle, il est herissé de spicules
 pointes principalement sur
 l'extrémité de la pièce inférieure
 de l'os (b).

9^e fait. Cet os a été cassé dans
 le même endroit et dans le même sens
 que le précédent mais la direction
 de la pièce d'en bas est bien différente,
 l'extrémité du bas se cache en dedans
 ce qui rend l'os convexe en dehors. (c)

10^e fait. fracture oblique à la
 cuisse droite, elle commençait
 entre les deux trochantères, et finissait
 environ trois pouces plus bas, sur
 la surface antérieure de l'os; la pièce
 inférieure a remonté par derrière
 la supérieure



Supérieure, et s'est contournée
de façon que le Condyle interne
est plus en devant qu'il ne devoit
l'être d'y a sur le côté interne du
Cul une exostose inégale et rabo-
tée. (a).

11^e fait. fracture de la cuisse
droite. Cette fracture très oblique
occupoit toute la partie moyenne
de la partie inférieure remontoit
un peu par devant la partie supérieure.
voilà le premier exemple bien —

constaté dont j'aye connoissance
d'une fracture au femur avec
chevauchement ~~et~~ en devant
et Cal. Car il me reste des doutes
sur la pièce représentée par de
Heide, elle est si mal dessinée que
je ne puis déterminer ^{ce que} si l'auteur a
voulu rendre, elle représente la
tête et le Col du femur vu par
derrière, le corps de la cuisse et les Condyles
vus par devant. Ce qui supposeroit
une contorsion trop considérable

pour que l'on puisse y ajouter foi. Ce n'est pas que la pièce inférieure
dans les
dans la pièce dont nous parlons —
dans et

Chevauchement du femur
en devant Seul exemple
que je connoisse, arrivé dans
une fracture oblique.

+ jadis le 1^{er} exemple bien —
constaté, parce qu'il me reste
quelques doutes sur celui de Heide
que j'ai rapporté ci devant, j'en
le juge que d'après la figure,
et la figure est si peu correcte
que je ne puis guère me déterminer
précisément sur les pièces de
chevauchement quelle
représente Car elle en représente
un.

Ce n'est pas que la pièce inférieure
d'un femur fracturé ne puisse être
contournée jusqu'à un certain point
et réunie à la pièce d'en haut dans
cet état de contournement

(a) même ouvrage. no. 265. p. 126.

(b) même ouvrage. no. 266. p. 125.

Dans cet article ci d'après ^{l'enquête} m. r.

Daubenton (a) la partie inférieure

de l'os, est contournée de façon que
le condyle interne avance plus
que l'externe. ~~il y a une extrémité~~
~~assez grosse et des~~
~~pointes sur le calus derrière les~~
~~à la partie moyenne.~~

Chuvauchement du fémur à son
côté interne, dans une fracture oblique,
Seul exemple que j'en aye.

12^e fait. fracture de la cuisse
droite. Cet os a été cassé par une
fracture obliquement à la partie
moyenne supérieure. la direction
de cette fracture, est du côté
intérieur, au côté extérieur de
l'os en descendant. aussi la pièce
inférieure a remonté sur le côté
intérieur. elle s'est inclinée de
sorte que son extrémité inférieure
se carte en dehors. et s'est contournée
aupoint que le condyle interne est
beaucoup plus en avant que l'externe
la formation du cal a été fort
irrégulière il ne s'étend pas sur
toute la longueur de la fracture
(c)



(a) *mem ouvrage* n° 268. p 128.

chevauchement du fémur en
dehors fracture oblique. Seul
exemple que j'aye de ce chevauchement externe.

13^e fait. fracture de la Cuisse gauche.
la fracture a traversé obliquement
la partie Supérieure de l'os en
descendant du côté externe au
côté interne. Sur la longueur
d'environ quatre pouces et demi
la pièce inférieure a remonté
sur le côté externe de la supérieure,
les deux pièces ayant été réunies
dans cette position par le cal —
l'os est resté concave en dedans.
la coupe du cal a été faite à
l'endroit de la fracture. on
voit dans l'intérieur qu'il est
aussi compacte et aussi uni que
l'os même. (a).

Corollaires

les fémurs malades de mû de ~~xxx~~
non de mû de ~~xxx~~ fracture recherche
point la fracture est entourée d'un
cal par apposition ou exostose
terrestre de l'os.

il Suit de tous ces faits au
nombre de 30. primo, que
^{le fémur sain} lors que le fémur est fracturé
^{il s'unit ordinairement} dans l'adulte, la fracture est
avec chevauchement; et que
c'est avec nos connoissances
présentes, dans cet état de
chevauchement

Chevauchement que les pieux
 fracturées se réunissent. j'en
 connois point encore de faits
 dans l'adulte <sup>2 en qui les os n'ont pas été cassés
 avant d'être cassés.</sup> qui contredise
 les deux conséquences. Dans
 l'enfance et dans la jeunesse
 c'est autre chose, on réduit —
 et on maintient réduites les —
 fractures du fémur, de sorte
 qu'à pres la réunion, il ne
 reste point de chevauchement,
 et qu'il ne reste point non plus
 de claudication.

le docteur Lantier que j'ai vu en juillet 1782
 qui étoit Cassé le fémur 6 ans auparavant
 boit un peu.
 M^r Lantier boit beaucoup.

j'ai vu un enfant qui à 5 ans
 s'étoit fracturé la cuisse gauche
 à 8 parties moyenne, à 4, quand
 j'examinai il l'avoit aussi longue
 que la droite aussi grosse, sans
 difformité alarie, et autouche.
 j'en connois un homme de 50
 ans

ans, qui dans son enfance a
eu la cuisse cassée, il est impossi-
ble aujourd'hui de reconnoître
celle qu'il a eu cassée, étant
l'une et l'autre de longueur
et de figures semblables.

Duverney (a) fournit un exemple
de l'al, à la suite d'une fracture du
femur, sans claudication et par
conséquent sans chevauchement,
dans un jeune homme de 14
à 15 ans. C'est l'âge le plus avancé
que je connoisse, où la fracture
du femur se soit guérie sans chevauchement.

Je n'examine point ici pour
quoi on guérit les enfans de leurs
fractures à la cuisse en faisant
disparoître le chevauchement, et
pourquoi on ne guérit pas
pareillement les adultes, ce qu'il
y auroit

(a) maladies des os T. I p 353

il y a un fait dans lequel de
 fracture ^{oblique} de la cuisse ou la jointe
 d'une des pièces se trouve placée
 après les extensions et les Contre-
 extensions dans le canal médullaire
 de l'autre pièce ce qui fit que cette
 cuisse étoit plus longue que la saine
 ce fait montre que l'on peut faire
 dans les fractures de la cuisse des
 extensions suffisantes pour affronter
 les pièces. que par conséquent si on
 guérit les adultes avec des lacs en
 chevauchement. Cela dépend surtout
 des vices des moyens de contention
 qui dans l'état où ils sont, sont
 insuffisants.

chevauchement par rapport
 aux os longs, est le déplacement
 d'une ^{ou} ^{2, antérieur} des pièces de la
 fracture sur toute la longueur
 de l'autre pièce de la même fracture
 du même os.

4 espèces de chevauchement
 du fémur.

il y aurait à faire pour corriger
 l'art en le point qui certainement
 a besoin d'être perfectionné. —
 nous nous expliquerons à ce sujet
 lorsque nous traiterons des
 fractures de la cuisse. mais je
 continue de rapporter les conséquen-
 ces qui résultent de tous les
 faits que nous avons notés.

2^o il y en résulte que dans
 les fractures du fémur le
 chevauchement est en arrière
 quand la pièce d'en bas passe
 derrière la pièce d'en haut.
 il y a 4 espèces de chevauchement
 en arrière c'est de haut en bas
 les plus

2^o il en résulte que dans
 les fractures du fémur il y a
 4 espèces de chevauchement,
 celui en arrière, quand la
 pièce d'en bas passe derrière
 l'extrémité

l'extrémité inférieure de la
pièce d'en haut.

Celui en devant quand la pièce
d'en bas passe devant l'extrémité
inférieure de la pièce d'en haut.

Je n'en connois qu'un exemple
dont j'ai été sûr. Ce qui montre combien

Cette espèce est rare en —
Comparaison du chevreuil
en arrière.

Celui en dedans ou du côté
interne; quand la pièce d'en bas
remonte le long du côté interne
de la pièce d'en haut. Je n'en
connois qu'un exemple.

et celui en dehors ou du
côté externe quand la pièce
d'en bas remonte le long du
côté externe de la pièce d'en
haut, je n'en connois qu'un seul
exemple.

Ces trois derniers chevreuils
ont cela de particulier, que dans
chacun d'eux, la fracture est
oblique.

+ ainsi toutes les fois qu'on trouvera au
 dessous un chevauchement qui n'est point
 en arrière, on peut dire ^{est fondé après} ~~est fondé~~ que la
 fracture est oblique, et le membre en
 longueur.

oblique, et c'est précisément
 de cette obliquité de la fracture,
 qu'ils dépendent. +

3°. le chevauchement entraîne
 nécessairement un raccourcissement du membre.

et le raccourcissement est
 proportionné ~~à~~ à la long-
 -ueur du chevauchement. —

les plus longs que je connoisse sont
 de 30, et 32 lignes, il y en a
 à plusieurs de 30 dans les faits
 dont j'ai fait mention. les plus
 courts sont de 13 lignes. les
 plus longs sont mieux d'avantage,
 mais offrent un mal plus fort
 quand les pièces chevauchantes
 se touchent dans toute l'étendue
 de leur sur faces chevauchantes.

ce qui n'arrive pas toujours, car
 on a vu obs. 2. un chevauchement
 de 26 lignes ^{n'avoit qu'} avec un mal d'un
 jour




propre de long. Ce qui est l'exces du mal en ce genre 95 Car on reunit
40 il est bien prouvé par tous a l'inconvenient du plus grand
Les faits que les Cals en chevauchem
-ent n'ont point de rivale. raccourcissement et de la plus
genante claudication. Celui qui
résulte d'un Cal de réunion Coart
et moins solide en le quel est
plus Coart.

5° que le Canal médullaire
se ferme en s'arrondissant, en
s'amenuisant dans les deux
pièces ^{de la fracture} précisément comme il
se ferme sur la seule pièce
restante après les amputations.
mais que dans les fractures
de la cuisse avec chevauchement,
cette fermeture du Canal
médullaire qui fait un Cal
de cloture, ne contribue en rien,
au Cal de réunion d'une pièce avec
l'autre pièce, ou s'il y contribue
quelques fois, ce n'est que fort peu.

6° que le Cal de réunion est
Celui qui se rencontre sur la long-
ueur des deux pièces entre les
deux pièces.

or si l'on a égard à la forme
du fémur



A est l'extrémité inférieure de la pièce d'en haut du fémur, dans la position où se trouve sa crête sur la face antérieure de la pièce d'en bas, dans le chevauchement en arrière.

Ceci offre des vues pour contenir ces deux pièces sur les côtes antérieurement qu'on ne fait pour les contenir avec de petites compressees posées sur les côtes qui remplissent les vides. avec de larges attelles qui répondent à l'épaisseur des os. la bande qui tient la pièce d'en haut en devant doit être surmontée. mais ce qu'il faut encore surmonter c'est la rétraction permanente des muscles qui font contenir pour empêcher le déplacement après la coaptation, après l'application d'un bandage et durant lequel malade est dans le lit.

Du fémur on trouvera quand il est cassé en travers à la partie moyenne dans l'adulte, avec chevauchement en arrière. que la crête ou ligne osseuse étroite de la face ^{et en supplantant quelque} postérieure de la pièce d'en haut, pose antérieurement sur la longueur de la face de devant de l'extrémité supérieure de la pièce d'en bas comme elle le doit. elle ne pose que par une ~~ligne qui n'a~~ surface qui n'est que très peu étendue en largeur. et qui laisse sur les côtés entre les deux pièces un espace triangulaire plus ouvert et plus étendu du côté externe que du côté interne. De là vient que ces deux pièces ont peu de stabilité l'une sur l'autre dans le commencement de la fracture que si le cal n'est formé que de

De l'étendue de la largeur de
 la crête du fémur il n'auroit point
 assez de solidité, les faits li-dessus
 montrent qu'il remplit constamment
 l'un et l'autre espace latérale
 compris entre les deux pièces. —
 ainsi quand ces deux canelures
 latérales sont creusées et vuides
 on a la preuve que le cal de
 réunion n'est point formé, et
 quand les bords des os ne sont
 pas arrondis on a celle que le
 cal de docteur n'est point enlève
 fait deux signes propres en
 pareil cas pour l'appareil ou
 en est le cal. D'autant plus propres
 à cet effet que l'on fait l'amen
 au moment où on lève l'appareil, par conséquent
 ou le membre est délié, sec, maigre.
 et non pas longtemps après l'avoir
 levé, que le tibia allonge se
 remplit, et que le membre a
 repris de l'embonpoint.
 une autre cause de ce
 remplissage.

remplissage de ces Canales latéraux,
~~qui~~ dépend dans certains cas de
 l'élargissement de la Crête du fémur —
 qui concourt avec la substance ou
 les substances du cal à donner —
 plus de stabilité aux pièces
 chevauchantes.

C'est encore la même chose.
 Dans le chevauchement en —
 devant les premiers contacts sont
 par une crête, ^{sur une face d'une}
 autre pièce. et il y a deux canaux
 triangulaires latéraux.

Ce n'est pas la même chose —
 dans le chevauchement en devant
 et dans ^{les} latéraux ou les fractures
 étant nécessairement obliques, les
 pièces se touchent plus ou moins —
 par les surfaces fracturées. Ce
 qui leur donne plus de stabilité
 que dans la fracture entravée
 avec chevauchement en arrière.
 une autre différence, ⁺ aux
 chevauchements

+ qui se rencontrent dans les
 chevauchements sur les côtes, et qui
 ne se touchent point dans celui en arrière
 et dans celui en devant



~~Chevauchement sur les Côtés~~ Côtés
 et que les Canelures sont lune en
 haut et l'autre en bas. mais
 moins profondes et plus étroites
 a raison de la forme oblique de
 la fracture et de la longueur du
 chevauchement.


+ dans les chevauchement
 sur les Côtés

70. j'ai trouvé des fémurs humains
 les uns de 13, les autres de 14 lignes
 d'épaisseur à leur parties moyennes
 en doublant les quantités on
 auroit pour épaisseur de ces os
 s'ils chevauchent d'un cheveu
 — chement en arrière 20 ou 22
 lignes, et j'ai trouvé des chevauchement
 de cette espèce avec l'al, ou les pièces ont
 mes de 26 lignes d'épais, d'autres
 ou d'elles en ont 34 (a). Dans les
 premiers cas lune des pièces sont
 aplatie ^{est} l'antérieure et supérieure
 le Cal a peu d'épaisseur entre d'elles
 deux, mais il en remplit les canelures
 latérales, dans le second le Cal
 a ou de 8 lignes d'épaisseur
 entre

(a) obs 2

Obs. 4^e de Mr Daubenton

go la longueur du chevauchement
peut dans certains cas comme dans l'homme
les os des jambes ne supportent point le poids
du corps et ne la mesure de la quantité
dont les muscles peuvent le raccourcir; au lieu
que dans les animaux où il y a chevauchement
au femur et qui en même temps posent
sur la jambe pour marcher à la rétraction
des muscles qui raccourcissent le chevauchement
est ajoutée la partie du corps qui l'augmente A
ou le fait fléchir B




entre les deux pièces, en même temps
que les canelures latérales sont
remplies ~~en même~~ et Mr
Daubenton (a) en décrit un qui
avoit près d'un pouce entre les
deux pièces.

Nous avons donc vu des cas
de cloture ou qui ferment le canal
médullaire, et des cas de réunion;
dans les fractures avec chevauchement
au femur il arrive la même
chose à tous les os longs qui
se réunissent dans un état de
chevauchement j'en ai l'appareil
dans un perone que je conserve.
mais qu'arrive-t-il aux os qui se
après avoir été cassés se réunissent
et se soudent lorsqu'ils s'affrontent
le canal de la moelle de la pièce
d'en bas demeure tel continue avec
celui de la pièce d'en haut, ou bien
se fait il à leur extrémité un
cal

Cal de cloture qui bouche le canal
médullaire de chaque pièce. et
un Cal de réunion.

faits tirés des fractures de
l'humérus, de celles du tibia ou les
pièces avoient été réunies ~~dans~~
tandis qu'elles s'affrontoient.

première observation A B



Coupe d'un Cal de la partie
moyenne. ^{tibia} ~~de l'humérus~~ le —



(la pièce correspondante
de l'humérus est dans
la boîte aux fractures.)

Canal médullaire de la pièce
d'en haut est séparé de celui
de la pièce d'en bas, la séparation
est de près de 2 lignes, la partie
est très compacte ainsi que le
reste de la substance compacte
de cet os. le canal médullaire
en haut comme en bas est arrondi
là où il a été fermé. les deux
pièces de cet os s'affrontoient

2^e observation C

Coupe d'un Cal à la partie moy
-enne ^{inférieure} de l'humérus, dont les deux
^{gauche} pièces



Cet os est plus courbe
qu'on ne voit ici.



pieces fracturées avoient chacune
un canal medullaire ~~distinct~~
distinct et fermé quasi que
reunies par affrontement. le
canal dans chaque piece se
terminoit en l'os.

obs. 3.

humerus gauche d'un enfant
râpé tique cassé en travers à la
partie moyenne supérieure,
courbe en dedans. reuni les pieces
étant affrontées. la ligne de separation
est encore apparente et marquée
par un sillon transversal d'ailleurs
en dehors et du côté convexe. en
dedans chaque piece a son canal
medullaire particulier. cet os est courbe

obs 4e. cubitus gauche d'un
adulte. la fracture en travers, est à la
partie moyenne inférieure, les deux
pieces s'affrontent et sont en partie reunies
dans cet état d'affrontement. leurs extrémités
sont gonflées un profond sillon les
separt on voit ^{2 par ce sillon} quelles sont arrondies,
que le canal medullaire est fermé
à l'apice

à la pièce d'en haut, ainsi qu'à la —
pièce d'en bas. Sur la longueur
du Cal et dans la direction de
l'angle antérieur du labitus est —
est une goutte lisse et semblable
à celles qui donnent passage à des
tendons.

Corollaires

Les quatre faits tirés de différents
os longs, fracturés à différents âges,
et dans différents états, prouvent que
lorsque le Cal se forme, les os étant —
afrontés, si ce sont des os longs, le —
canal de la moelle se forme à la —
pièce d'en haut ainsi qu'à la pièce
d'en bas, ainsi il y a dans le cas, —
comme dans les amputations une
cloture du canal de la moelle, à la
différence que dans les amputations,
cette cloture ou le Cal de cloture
ne sauroit avoir lieu qu'à la seule
pièce supérieure qui est la pièce —
restante, tandis que dans les —
fractures en travers avec affrontement
le Cal de cloture a lieu tant par
rapport à la pièce d'en haut que
par

par rapport à celle d'enbas. ainsi —
 Cette propriété qu'ont les os longs, lors
 qu'ils sont fracturés, affrontés et —
 réunis dans cet état d'afrontement
 de se fermer à leur extrémités, et
 de faire que le canal médullaire —
 autrefois unique est partagé en deux
 par une substance osseuse qui —
 quelque fois est très compacte et —
 d'autre fois simplement cellulaire —
 Cette propriété dis-je ils la partag-
 ent avec les os longs réunis dans
 un état de chevauement. mais
 il y a entre le Cal des os longs —
 en affrontement et celui des os longs
 en chevauement cette première —
 différence qui est notable, savoir —
 que les Cals de closture et de réunion
 sont appliqués l'un sur l'autre et
 comme confondus ensemble dans
 dans le Cal des os longs avec affrontem-
 ent; et au lieu qu'ils sont tout —
 à-fait distincts et séparés l'un de
 l'autre.



l'autre, du moins pour la plus grande
partie et le plus souvent dans le Cal
en chevauchement, ce qui rend commu-
-nement le Cal en affrontement
plus solide que celui en chevauc-
-hement.

Or comme nous savons par nos
observations ~~sur~~ et par nos expériences
relatives à la section des os longs
dans les amputations que le qui doit
le canal médullaire est le périoste,
non pas seulement le périoste externe,
² ~~entore~~ et plus particulièrement
mais celui qui partant du périoste
externe et faisant fonction de
gaine, se repand dans l'intérieur

des fibres osseuses ou il accompagne
les vaisseaux ² ~~sanguins~~ dans l'éponge de l'os.
C'est ~~lui~~ ² ~~ce dernier~~ celui qui pénètre dans les pores tous les points de la surface qui après les
fractures amputations
l'os, rougit, en fait tomber une partie.
ou sensiblement, ou insensiblement

l'amenuise, l'arrondit en un mot lui
ôte les angles. après avoir opéré tous
ces effets il se convertit ² ~~avec l'écoulement de l'os~~ en substance
comme cartilagineuse, rapproche les
parois du canal, le forme de joint

au tissu Cellulaire ^{des muscles} dont il est couvert
et ensuite s'endurcit.

Ce qui arrive au Cal de Cloture
après l'amputation; arrive pareillement
au Cal de Cloture ~~après~~ dans les
fractures réunies en chevauchement,
et dans celles réunies en affrontement.

L'os se ferme dans les ^{os} dans les ^{os} par
la substance que le périoste pousse dans
l'os.

Nos observations sur le Cal de
Cloture, et sur celui de régénération, l'un
et l'autre si distincts dans les os
réunis en chevauchement, nous ont
dévoilé des mêmes propriétés la
même structure, les mêmes
substances dans les deux Cals. —
or étant confondus et joints ensemble
dans les fractures réunies en
affrontement il étoit ^{difficile} ~~assez~~ naturel
~~que cela embrouillât l'esprit~~ n'ayant
point fait les observations, que
l'on n'ait l'existence de l'ancien os
autour



il étoit difficile de raisonner
 sur le Cas composé sans se tromper.
 Mr Duhamel avoit trop nous
 reprochés en disconvenis quand il
~~prétendait~~ rapportoit le Cal à une
 visole osseuse, visole qui n'existe
 aucunement dans les fractures réunies
 en chevauchement, mais il n'en est
 pas moins vrai que le Cal interposé
 entre les deux pièces ne provient du
 périoste servant de garnie et
 dans certains Cas du périoste qui
 plonge dans les (α) et il n'avançoit
 point assez quand il croyoit sur la
 foi de certaines expériences trop récentes
 que sous la visole on trouvoit les os —
 encore fracturés, plus tard ils sont
 complètement ^{reunis} ~~reunis~~ le canal est
 fermé ce n'est point la visole qui
 opère cette clôture, mais ce sont
 les prolongemens que le périoste porte
 dans les os, tandis qu'à l'extérieur
 tant qu'il n'a point été détruit
 il lui

(α) Comme on peut en juger par la
 disposition de la lame osseuse solide
 qui auroit dû se rencontrer à l'une
 des faces de le Cal et qui est réduite
 en cellule jusqu'au Canal médullaire
 dans l'aprice no 4.

+ dans certains Cas

Car quand on les examine longtems
 après la guérison on les trouve réunis,
 on trouve le Canal médullaire formé

to Mr Duhamel



+ pour achever de convaincre
S'il restoit encore quelques doutes ou
quelques obscurités sur cette matiere,

il lui procure en effet, si les os
sont affrontés d'abord une espèce
de gaine cartilagineuse, puis une
vivole ossée. ainsi quand ceux
qui ont prétendu affirmer l'opinion
de M. Duhamel sur le qu'il y a des
fractures ou ils n'ont point trouvées
devient, et que dans d'autres
la réunion se fait au moyen de
substance vasculaire qui émanent
des os. ils présenteraient des difficultés
faciles à lever d'après nos observations,
ce qui est interprété entre les os
chevauchant et réunis dans cet état,
est le pont qui s'étend ainsi que
le pont. Ce qui émane des bords
mêmes des os, les clos, le pont est le
pont prolongé ^{en} ~~en~~ ^{en} ~~en~~ ^{en}
cellulaire dans les.

Cellulose
+
mais, metons sous l'œil
de nos auditeurs ce qui arrive
autour d'eux quand ils sont fracturés,
au point de vue des expériences.

rapportons a cet effet ^{que nous} nos propres

experiences
~~que nous ayons suivies nous même.~~

109

Car il ne faut pas que dans une
matière qui a tant divisé de savants,
matière sur laquelle nous voulons essayer de lever les doutes
qu'elle offroit enlors, afin que ce que nous aurons à dire par la suite soit plus
fondé. ~~on nous acquiesce~~ — il ne faut point dis-j-e
~~on nous acquiesce~~ — que nous nous refusions à quoi que
ce soit qui puisse nous instruire, ni que
l'on puisse nous acquiesce
ou que sur des théories, ou que
sur des expériences et des faits
empruntés, et que nous n'ayons
point vu

en 8bre 1770 j'ai fracturé l'humérus
à sa partie moyenne à ^{trois} ~~un~~ lapins
de plus de 13 mois, et à une ~~vieille~~
^{2 de plus de 2 ans} lapine; et j'ai abandonné ces fractures
à elles même. pour mieux distinguer ce qui regarde le cal de cloture, et le cal,
de réunion que j'avois intérêt de ne point confondre. Comme ont fait ceux qui se sont occupés
de recherches sur la nature et la formation du cal avant moi.
état du cal au bout de 6 jours première expérience

Dans un de ces jeunes lapins.

les pièces chevauchaient de plus
de 4 lignes, les bouts des os étoient
anguleux ça et là, non ramolis; ⁺ d'une pièce à l'autre par dessus et
autour de la fracture étoit une
substance
membraneuse rougeâtre, inflam-
-mée, un peu ferme, tirant plutôt
sur la consistance de chair, que sur
celle

⁺ le canal médullaire étoit ouvert
rond dans les deux pièces.

⁺ d'une pièce à l'autre par dessus et
autour de la fracture étoit une
substance

ainsi ~~à cette date de 6 jours~~
 # Dans cette expérience le cal
 de réunion est plus avancé au bout
 de 6 jours que le cal de cloture. le cal
 de réunion se présente à cette date
 sous la forme d'une membrane un
 peu forme rouge ^{à l'extrémité} venant du péricoste,
 et du tissu cellulaire. et non neyelle
 encore du bout des os, il s'en sort, ouvert,
 ronds, anguleux non exfoliés.

de l'expérience

* elle communiquoit en dehors
 avec le tissu cellulaire des
 muscles, dont elle paroissoit
 être une continuation



Celle de Partilage. Cette substance
 étoit visiblement ~~paroissoit être~~ la Continuation du
 péricoste qui entourait les bouts de
 l'os près de la fracture, et qui se
 confondoit avec le tissu cellulaire
 des muscles. ayant ouvert l'espèce de
 tumeur que formoit cette substance
 renflée autour ^{de la fracture} des bouts de l'os
 et qui représentoit la visière de l'os
 du hamel. ^{mais qui n'estal alors que dans l'état de} il en sortit quelques
 gouttes de sérosité sanguinolente.

 état du cal au bout de 9 jours
 dans un de ces jeunes lapins.

Les pieds chevauchent d'environ
 quatre lignes, la fracture étoit
 entourée d'une tumeur ovale,
 blanche et souple à l'extérieur.
 J'ouvris cette tumeur en long jusqu'à
 l'os, je vis sensiblement quelle
 aboutissoit au péricoste tant en haut
 qu'en bas, et quelle se joignoit en
 dehors je ne remarquai point à
 cette date de neuf jours, cette
 sérosité

Sérosité sanguinolente que j'avois
observé dans l'expérience précédente,
à celle de 6 jours. Cette substance

blanche qui entourait la fracture
étoit étroitement appliquée ~~aux~~ autour des pièces, à l'endroit de la
fracture, ~~elle les~~

~~bouts de l'os~~, elle les affermissoit,
elle se glissoit ^{de plus} entre leurs extrémités;

Du côté quelle regardoit les pièces
osseuses, elle étoit comme cartilagin-

-euse, grainue par endroits, dure

et comme osseuse. il y avoit sur
~~la~~ ^{le} ~~bout de l'os~~ ^{le bout de la pièce d'os} rompu, une espèce

de bouchon ~~forme~~ épais d'une ligne
ou deux d'une substance en partie

cartilagineuse, et en partie grainue
et tenue ou endurcie. les bouts

du canal s'arrondissoient. #

état du Cal au bout d'orange
jours, dans un de ces jeunes lapins.

les os chevauchent de 3 à
4 lignes, la fracture étoit en travers

comme dans les deux expériences —
^{l'os du cal étoit sur la fracture}
précédentes. Ce qui entourait les bouts

des os rompus étoit comme membraneux
à l'extérieur

autour des pièces, à l'endroit de la
fracture, ~~elle les~~

Cette substance pouvoit de
l'extrémité de l'os. on distingue
à cette date le Cal de clôture il
^{sort} il pousse de l'os des bouts de l'os ~~après~~
après qu'ils ont été arrondis et
exfoliés. ~~il les~~ ~~il les~~

Celui de réunion vient de la
surface mais tous deux ^{sont produits}
~~par le~~ ^{par le} ~~superficie~~ et ^{par} ~~la~~ ^{la} ~~cellulaire~~ ^{cellulaire} etc
qui se confondent avec l'éponge des os


3^e expérience

+ au moyen d'une substance grainée
comme Cartilagineuse, qui avoit
poussé du bout de chaque pièce,
et qui provenoit duperioste, de
l'intérieur delos et de la membrane
de la moelle.

^{cette étoit visiblement}
à l'extérieur, ~~la~~ la continuation
duperioste et du tissu Cellulaire entre
musculaire. Intérieurement cette
Substance qui entouroit la fracture
étoit Cartilagineuse, dans quelques
endroits comme offuse. Chaque bout
du canal du côté de la fracture
s'arrondissoit, perdoit les angles, s'exfoli-
oit se bouchoit, un peu au dessus, et
au dessous de la fracture, les deux
pièces ^{des} s'étoient gonflées, d'avantage
celle d'en bas ^{qui étoit plus courte} que celle d'en haut,
^{qui étoit plus longue.}
On remarquoit un petit épanchement
Sous le Cal de réunion et sur celui
de clôture.
~~Cal de réunion et les bouts d'os et~~
Sur le bout des os précisément un
Cal de clôture d'une substance
grainée comme Cartilagineuse
provenant duperioste de l'intérieur
delos qui les bouchoit après les avoir
arrondi.

4^e. expérience

Etat du Cal au bout d'unze
jours dans une lapine de plus de deux
ans.



Les os chevauchent d'environ trois
lignes, la fracture étoit oblique, et
avec esquilles, les esquilles étoient ^{rompues,} détachées obliquement
de l'extrémité inférieure de l'apice d'en
haut, ^{sans en être détachées} et transversalement d'avec
celle d'en bas. Les 2 cals celui de clo-
sure, et celui de réunion étoient
moins avancés dans cette ~~vieille~~ lapine de deux ans et plus,
à cette date douze jours, qu'ils ne
l'avoient été dans le lapin de 3 mois
à 9, et à 11 jours.

Le membre étoit plus mobile à
cette date douze jours
l'endroit de la fracture, que dans le
jeune lapin; les pièces rompues étoient
encore entièrement séparées l'une
de l'autre. Les bords du canal cassé
en flûte à la pièce d'en haut, et en-
travers à la pièce d'en bas étoient
ouverts, ~~non rapprochés~~ ^{conservent}
leur vive arête, ^{seul se dissolvent} non ne se dissolvent
encore pour les arrondir, les amincir,
les exfolier, les fermer. Dans un point
seulement la membrane qui devoit
former le cal de réunion passoit
sur le bord de la biseau de l'apice
d'en haut et se joignoit à la
membrane de la moëlle. et il y
avoit

le cal de réunion quoi qu'il ne soit point encore
attaché sur les pièces à l'endroit de la
fracture il les resserre

avoit entre les extremités anguleuses
des pieces rompies une couche de sang
coagulé épaisse d'une demi ligne, une
membrane passoit d'une piece à l'autre
à l'exterieur et autour de la fracture,
elle ~~ne~~ communiquoit avec le perioste
dont elle étoit la continuation, et avec
le tissu cellulaire entre musculaires,
elle s'implantoit fortement à chaque
piece, d'un au dessus et au dessous de la
fracture elle étoit fort éloignée de
l'état cartilagineux du cal de 9 jours
du jeune lapin, et de l'état ossif du cal
d'unze jours du lapin de 13 mois. Seule
dans le lieu de cette fracture ou

quand les esquilles sont détachées et
privées du perioste elles sont centées
ne pas reprendre. quand elles ne sont
point détachées ni dépourvues de perioste
elle reprennent ordinairement. pourquoi
cela? C'est que le perioste organe
reparateur ne subsiste plus dans le
premier cas. et qu'il subsiste dans
le 2^d. De sorte que dans le second il repart
ou peut reparer ce qu'il ne sauroit faire
dans le 1^{er} au lieu que dans tous les 2^{es} rien
n'empêcherait le sue osseux selon l'opinion ancienne
en separeant de sonder les esquilles détachées ainsi que
celles qui ne le sont pas

~~que l'on ne remarquait point ailleurs
en sorte que l'on pourroit croire, que
que les esquilles, quand les pieces ne sont
point détachées et dépourvues du perioste
hateraient dans les vides animaux la
formation du cal. Ce n'étoit point
vis à vis de la fracture. que cette
membrane environnante offroit
des dispositions plus prochaines à
devenir cartilagineuse et osseuse
l'endurcissement étoit aux endroits~~

la ou



chevauchement. Dehllief mem de long p. 108

le femur d'un de mes canetons dit au Dehllief ayant été fracturé dans son milieu
l'extrémité inférieure au-dessous elle étoit attachée fort obliquement.

Il étoit de la dernière un plan d'une substance osseuse et poreuse
d'un rouge vif qui alloit s'attacher à la partie antérieure du bout inférieur
celui-ci fournissoit un plan tout semblable qui étoit à la partie. Ces
deux plans fermoient le canal médullaire chacun de son côté

une autre masse différente de ces deux plans unissoit les deux bouts
de la cassé, étoit elle qui les retenoit ensemble avec plus de force elle
étoit poreuse de tous côtés et régulière, elle étoit osseuse et alluaire
et une substance osseuse et spongieuse nouvellement formée
bouchoit une partie du tuyau osseux



St. John's, Nfld. 1880

My dear Mother
I received your letter of the 10th inst. and was
glad to hear from you. I am well and hope
these few lines will find you the same. I
am not at home much at present but will
write again soon. I am very affectionately
remembered to all. I am, dear Mother,
your affectionate son,
John J. [Name]

la ou cette membrane s'implantoit, au
 dessus et au dessous de la fracture à —
 chaque pièce d'os; à partir du lieu de
 ces implantations. delà l'endurcissement
 cartilagineux, ensuite osseux, s'étendoit
 en approchant de la fracture. ayant
 dépouillé de cette membrane, et —
 examiné de plus près les pièces fracturées,
 il se trouva des incrustations osseuses,
~~delà~~ aux endroits des implantations
 de la membrane dont j'eus de parler,
 ou bien du périoste, à ces pièces osseuses.
 Ces implantations, comme les incrustations,
 étoient à 5 et à 6 lignes de la fracture
 sur la pièce inférieure, à pareille
 distance sur la pièce supérieure.

Si cette incrustation fut venue de
 la fracture, eut été l'effet d'un suc élargi
 des bouts des pièces de la fracture elle se —
 seroit amassée entre les pièces et au
 environs de la fracture, préférablement
 sur la partie la plus déclive de l'intérieur
 de l'enveloppe membraneuse, entre cette
 enveloppe et l'os. au lieu de cela, —
 elle s'étoit d'abord formée dans l'épaisseur
 des fibres de la membrane, au lieu même
 ou elle s'implantoit, dans l'os, à 5 et à 6
 lignes, non pas simplement au dessous, mais
 en même

en même tems au ~~dessus~~ ^{dessus} de la
 fracture. il est vrai qu'à cette distance
 par ou le Cal commençoit à se former
 il étoit ~~il étoit~~ un peu plus avancé
 sur la pièce inférieure que sur la
 Supérieure, ^{2 mois le n'étoit} non pas par un effet d'un
 épanchement que l'on supposeroit venir
 de l'intérieur de la fracture. ^{étoit} ~~non~~ par
 ce que le Cal se forme plus promptement
 sur les os, ou sur les parties des os,
 à proportion de ce qu'ils sont moins
 durs. or dans le cas présent la pièce
 inférieure n'avoit que 9 lignes de
 long, la Supérieure en avoit 21.
 ainsi la partie ou le Cal commençoit
 à se former sur la pièce inférieure,
 n'étoit qu'à 3 ou 4 lignes des condyles
 de l'hammon, et se rapportoit à une partie
 peu dure et spongieuse, au lieu que
 celle où il commençoit à se former sur
 la pièce d'en haut, étoit vers la partie
 de la partie moyenne de la pièce
 d'en haut c'est vers la partie la plus
 compacte et la plus dure des os.

Conséquences de nos 4 expériences.
 Sur les fractures faites à 3 lapins
 de 3 mois et d'une lésion du fémur de
 2 ans.

on voit ^{2^o primo} par les expériences que
 dans le jeune lapin de trois mois le

Cal



Cal de réunion et celui de cloture sont
 déjà fort avancés l'un et l'autre au bout
 d'unze jours d'exposition. tandis qu'à
 la même date dans la lapine de plus
 de deux ans, on ne découvre point encore
 de traces de cal de cloture, et que l'on
 ne voit qu'à peine de cal de réunion.

2°. que dans la même fracture
 le cal de réunion se manifeste plutôt
 que celui de cloture. Ce qui est prouvé
 par notre première expérience, où
 le cal de réunion paroissoit le 6, sous
 la forme d'une membrane, tandis —
 que celui de cloture ne paroissoit
 point encore.

3°. que le cal tant de réunion —
 que de cloture, ne croissent point
 toujours ~~aussi abondamment~~ et aussi
 promptement à l'une des pièces
 de la fracture qu'à l'autre. que
 dans le jeune lapin un cal de cloture
 d'unze jours étoit plus avancé à la pièce
 inférieure de l'humérus qui étoit plus
 courte qu'à celle d'en haut, que cette
 pièce d'en bas étoit plus gonflée, les
 deux pièces étoient gonflées, mais
 celle d'en bas

D'en bas plus sensiblement que celle
d'en haut. la raison de ces différences
est que l'os est moins dur à ses extrémités
qu'à son corps. que là où il est moins
dur on peut le considérer comme un
jeune os, ^{ou le cal se forme plus tôt} et que là où il est plus dur
on peut le regarder comme un os
plus âgé, ou le cal se forme plus tard.
D'ailleurs qu'une fracture en os longs
se réunit plus tard quand elle est
à la partie moyenne, que quand
elle est à ses extrémités. Soit

Supérieures soit inférieures (a)

Le gonflement de l'os fracturé à
quelques lignes de distance de l'extrémité
de cet os est un phénomène, auquel
il faut faire attention. C'est à l'endroit
de ce gonflement que le périoste s'attache
plus étroitement, l'exemple que nous
en offre l'expérience 4 sur la lapine
de deux ans et plus, est frappant. on
y voit que le périoste s'attache fortement
à l'os, et que c'est par là que le cal
de réunion commence à devenir cartilagineux
à l'os. par l'expérience
trois que c'est

(a) Dans l'ancienne doctrine qui rapportait
le cal aux sucs osseux on redoutait les ankyloses
quand une fracture avoisinait une articulation
mouillée appropriée un bandage de tulle et
de plâtre doux pour prévenir le rapprochement
des parties et il y a tout lieu de croire que
c'est le gonflement l'œdème alors par dilatation
qui est cause de cet effet. et qu'en comprimant
l'os en modérant son gonflement avec le bandage
qui modère la tumeur du cal dans cette partie
celluleuse de l'os on prévient cette ankylose
que l'on attribue trop vaguement à des sucs
osseux épanchés.



que c'est à l'endroit de l'attache — 119
étroit du perioste à l'os, que l'os se gonfle
qu'il pousse dans la substance des prolongemens
qui se développent eux mêmes, pour
en exfolier l'extrémité en l'amenuisant.
Nous avons suivi ces prolongemens jusque
dans les mêmes dans cette fracture de
21 jours d'un enfant de 7 ans dont nous
avons parlé ci devant.

4^e Ces expériences viennent donc à
l'appuy de nos observations précédentes
pour prouver que le cal de réunion —
vient du perioste servant de gaine
à l'os, et du tissu cellulaire qui se
joint au perioste. que celui de closure
vient encore du perioste, mais de la
perioste que la gaine du perioste —
repasse dans les mêmes par tous les
pores, les trous qui de la surface —
tant internes, qu'externes ne pénètrent
dans son épaisseur. C'est le perioste
qui repart l'os. il est pour l'os ce que
le tissu cellulaire, dont il n'est que
la continuation, est pour les chairs, il
les enveloppe les protège, les nourrit
et sert à les